

<https://helda.helsinki.fi>

Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa

Vuolanto, Pia

2020

Vuolanto , P , Kemppainen , L , Kemppainen , T & Nurmi , J 2020 , ' Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa ' , Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti , Vuosikerta. 57 , Nro 1 , Sivut 44-56 . <https://doi.org/10.23990/sa.80288>

<http://hdl.handle.net/10138/318045>

<https://doi.org/10.23990/sa.80288>

unspecified

publishedVersion

Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.

This is an electronic reprint of the original article.

This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Please cite the original version.



Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa

Tarkastelemme tässä artikkelissa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttöä Suomessa vuosina 2008 ja 2018. Täydentävillä ja vaihtoehtoisilla hoidoilla tarkoitetaan monimuotoista joukkoa erilaisia hoitomuotoja, joita ei tietyssä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa pidetä valtavirtalääkinnän osana eikä niitä ole integroitu terveydenhoitojärjestelmään. CAM-hoitojen käyttö virallisesti hyväksyttyjen hoitomenetelmien sijasta tai ohella on merkittävä, mutta maassamme vähän tutkittu ilmiö. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten paljon suomalaiset käyttävät CAM-hoitoja ja millaisia muutoksia käytössä on tapahtunut vuodesta 2008 vuoteen 2018. Tarkastelimme, millaisia hoitoja suomalaiset käyttävät sekä sitä, kokivatko käyttäjät saaneensa hoidosta apua. Tutkimme myös, millaisia mielikuvia suomalaisilla oli eri hoitomuotojen mahdollisuuksista parantaa jokin sairaus. Tutkimusaineistona käytimme Taloustutkimuksen keräämiä kyselyitä, joita analysoimme Khiin neliön testillä, eksploratiivisella pääkomponenttianalyysillä ja lineaarisella regressioanalyysillä.

Tulostemme mukaan CAM-hoitojen käyttö oli vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Käytetyimmät hoitomuodot olivat suun kautta otettavat tuotteet (luontaistuotteet, ravintolisät ja rohdosvalmisteet). Muita yleisesti käytettyjä hoitomuotoja olivat rukous, akupunktio ja kiropraktiikka. Vaikka yleinen usko hoitojen parantavuuteen oli laskenut, niin hoitoja käyttäneet kokivat edelleen saaneensa hoidosta apua. Terapioita, joihin sisältyy asiantuntijan hoidettavana oleminen, käyttivät eniten naiset ja vanhemmat ikäluokat. CAM-hoitojen ja valtavirtalääketieteen käyttö eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa eli CAM-hoidot eivät vähentäneet valtavirtalääketieteen käyttöä. Vastaajat hakivat apua laajasti eri hoitomuodoista.

ASIASANAT: täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, CAM, CAM-hoitojen käyttö, uskomuslääkintä, Suomi

PIA VUOLANTO, LAURA KEMPPAINEN, TEEMU KEMPPAINEN, JOHANNA NURMI

YDINASIAT

- Suomalaisen täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käytöstä tiedetään vähän
- CAM-hoitojen käyttö oli vähentynyt kymmenen vuoden aikana
- Käytetyimmät hoitomuodot olivat suun kautta otettavat tuotteet (luontaistuotteet, ravintolisät ja rohdosvalmisteet) ja muita yleisesti käytettyjä hoitomuotoja olivat rukous, akupunktio ja kiropraktiikka
- Kyselyitä on kehitettävä, että CAM-hoitojen käytöstä saadaan tietoa hoitojen sääntelyä ja väestön terveydenhoitokeinojen seurantaa varten

MITÄ OVAT CAM-HOIDOT?

Tarkastelemme tässä artikkelissa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttöä Suomessa vuosina 2008 ja 2018. Täydentävillä ja vaihtoehtoisilla hoidoilla tarkoitamme monimuotoista joukkoa erilaisia terveyden hoitamisen tapoja. Suomessa vuonna 2009 tehty selvitys vaihtoehtoishoidoista listasi Suomessa yleisesti käytössä oleviin terapiamuotoihin antroposofisen lääketieteen, aromaterapian, fytoterapian, homeopatian, kajavaterapian, perinteisen suomalaisen jäsenkorjauksen, perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja vyöhyketerapian, mutta samalla selvityksessä arveltiin, että erilaisia hoitomuotoja saattaa olla maassamme jopa 100–200 (1). Sen sijaan, että listattaisiin kaikki hoitomuodot, on tutkimuksissa pyritty luokittelemaan niitä (2–4). Yhdysvaltalaisessa selvityksessä vuodelta 2005 (5) hoitomuotoja luokiteltiin niiden oletetun vaikutuksen mukaan seuraavasti:

- Energiahoidot (kuten qi gong, reiki, terapeuttinen kosketus), joissa vaikutetaan kehoon energiakentillä,
- Manipulatiiviset hoidot (kiropraktiikka, hierontahoidot), jotka perustuvat kehon liikkutteluun,
- Kehomielihoidot (hypnoosi, meditaatio, rentoutushoidot), joilla vaikutetaan kehoon mielen avulla,
- Luontaistuotteet (yrttivalmisteet, vitamiinit, ruokavaliohoidot), joissa hyödynnetään kasvien lääkinnällisiä vaikutuksia tai erilaisia ruokavalio- ja paastohoitoja,
- Terveydenhoitojärjestelmät (kiinalainen lääkintä, auyrvedinen lääkintä, antroposofinen lääkintä, homeopatia), jotka muodostavat kokonaisia lääketieteestä selkeästi erottuvia terveydenhoidon kokonaisuuksia.

Yksi tätä laajempi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen luokitustapa on Yhdysvaltain kansallisen lääketieteen kirjaston luokitusjärjestelmässä (Medical Subject Headings, MeSH; 6), jossa hakutermi 'complementary therapies' sisältää laajan kirjon hoitoja (7). Hakutermi kuvaa, mitä hoitoja kansainvälisessä lääketieteen sanastossa sisällytetään näihin hoitoihin.

Suomessa julkisessa keskustelussa täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista käy-

tään esimerkiksi termejä uskomuslääkintä, huuhaa, puoskarointi, täydentävä hoito, vaihtoehtoinen hoito, yhdistävä tai integroiva hoito, luontaishoito, CAM-hoito, perinnehoito tai perinteinen hoito ja lääketieteen ulkopuolinen hoito (8,9). Termeillä pyritään ottamaan kantaa keskusteluissa, joissa kiistellään hoitojen käyttökelpoisuudesta terveyden hoitokeinoina (10). Osa termeistä on latautuneita ja niillä ilmaistaan omaa kantaa kiistoissa. Esimerkiksi termillä uskomuslääkintä liitetään eri terapiamuodot ihmeisiin ja yliluonnollisiin voimiin ja luodaan vastakainasettelua potilaiden ja lääkäreiden välillä (11,12). Artikkelimme tarkoituksena ei ole ottaa kantaa kiistoihin, joten olemme pyrkineet löytämään mahdollisimman neutraalin termin, jolla kuvata täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa näistä hoitomuodoista käytetään yleisimmin käsitettä täydentävä ja vaihtoehtoinen lääkintä (CAM= complementary and alternative medicine) tai täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (2,3). Käytämme jatkossa artikkelissa CAM-lyhennettä, vaikka sekään ei ole aivan puolueeton termi (10,13).

Suhtautuminen CAM-hoitoihin vaihtelee kulttuurista ja hoitomuodosta toiseen sekä väestössä että terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa (10,14–15). CAM-hoidoiksi luokitelluista hoitomuodoista esimerkiksi akupunktio, osteopatia ja naprapatia ovat Suomessa Valviran nimeksesuojattuja ammattinimikkeitä (16). Joidenkin hoitojen tehokkuudesta on tehty lääketieteen piirissä tutkimuksia, joista osa kliinisiä kokeita (17). Tutkimuksia tehtiin etenkin kehomielihoidoista, taideterapioista (MeSH-luokituksessa 'sensory art therapies'), akupunktuurista, fytoterapiasta ja manipulatiivisista hoidoista (17). Joitakin CAM-hoitoja voidaankin pitää näyttöön perustuvina (18–19). Usein rajanveto CAM-hoitojen ja muun lääkinnän välillä on kuitenkin etenkin maallikolle vaikeaa ja tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi jako tehottomiin ja haitallisiin hoitoihin on haastavaa myös terveydenhuollon ammattilaisille.

CAM-KÄYTTÖTUTKIMUKSEN HAASTEET

Vakiintumattomat CAM-hoitojen määritelmät vaikeuttavat vertailututkimuksia (20). Joissakin tutkimuksissa CAM-hoidoksi on määritelty esim. kasvis- ja vegaaniruokavalio sekä hieronta, mutta toisaalta lisäravinteiksi ei ole laskettu vitamiini-

ja hivenainevalmisteita. Sellaisetkin kokonaisuu-
det kuin perusvitamiinit, liikunta ja ruokavalio
lasketaan joissakin luokituksissa ja monissa tut-
kimuksissa CAM-hoidoiksi. Se lisänee käyttöas-
tetta huomattavasti verrattuna siihen, jos niitä (ja
esim. klassista hierontaa) ei laskettaisi mukaan.
Vitamiinien määrittely joissakin tutkimuksissa
CAM-hoidoiksi on esimerkkinä CAM-hoitojen ja
virallisten hoitojen liukuvasta rajasta (14). Joskus
kysytyjä hoitoja muutetaan vastaamaan muu-
toksia, jotka aiheutuvat joidenkin CAM-hoitojen
muututtua harvinaisemmiksi tai toisten vastaa-
vasti suosittummiksi. Esimerkiksi sinänsä vertailu-
kelpoiseen yhdysvaltalaisutkimukseen kysytyi-
hin hoitomuotoihin oli vuonna 2017 lisätty na-
turopatia, homeopatia, parantajalla käynti, eri
rentoutumistekniikat, eri meditaatiotekniikat se-
kä jooga (21).

Tutkimuksissa käytetyt erilaiset tavat luoki-
tella CAM-hoitoja hankaloittavat niin käytön
ajallisen muutoksen seurantaakin kuin maiden välis-
tä vertailua. Hoitoja on jaoteltu esimerkiksi pe-
rinnelääkintään, manuaalisiin terapioihin, keho-
mieli-terapioihin, luonnonlääkintään ja muihin
lääkintäjärjestelmiin (2). Monissa viimeaikaisissa
CAM-hoitojen käyttöä tarkastelevissa tutkimuk-
sissa luokitellaan hoitoja perustuen esimerkiksi
amerikkalaisen National Center for Comple-
mentary and Integrative Health, NCCIH (aiem-
min National Center for Complementary and
Alternative Medicine, NCCAM) keskuksen jaot-
teluun, joka luokittelee CAM-hoidot kolmeen eri
kategoriaan: 1) ulkoisesti ja sisäisesti käytettävät
valmisteet (esim. yrtit, vitamiinit ja lisäravinteet),
2) keho-mielihoidot (esim. akupunktio, osteopa-
tia, jooga, meditaatio) ja 3) kokonaiset hoitojär-
jestelmät (esim. kansanparannus, homeopatia,
kiinalainen lääketiede) (3). Tätä edeltäneessä
luokituksessa, jonka esitimme artikkelin alus-
sa, jaoteltiin erikseen myös 4) manipulatiiviset
hoidot sekä 5) energiahoidot (22). Itse olemme
aiemmin käyttäneet tähän perustuvaa luokit-
telua eurooppalaisessa vertailututkimuksessa,
jossa hoidot kategorisoitiin aasialaiseen perinne-
lääkintään, vaihtoehtoiseen lääkintään, manuaa-
lisiin terapioihin ja keho-mieli -terapioihin (4).

Eri tutkimusten vertailua hankaloittaa myös
se, että kyselyissä CAM-hoidot saatetaan esi-
tää vastaajille listaten lukuisia yksittäisiä hoito-
muotoja tai useita hoitomuotoja yhdistäviä ka-
tegorioita, tai hoitojen käytöstä saatetaan kysyä

avoimilla kysymyksillä. Eri kysymystapojen on
katsottu vaikuttavan käytön raportointiin esi-
merkiksi siten, että yksittäisten hoitojen listaami-
nen lisäisi käytön raportointia, kun taas avoimet
kysymykset vähentäisivät sitä, koska vastaaja ei
välttämättä muista käyttäneensä CAM-hoitoa
tai ei ajattele käyttämänsä hoidon lukeutuvan
CAM-hoitoihin (20). Myös kyselyissä käytetty
ajallinen ulottuvuus vaikuttaa käytön raportoin-
tiin. Käytön tutkimusta onkin pyritty standar-
doimaan, jotta voitaisiin kerätä kansainvälisesti
vertailukelpoista aineistoa (20,23,24).

CAM-HOITOJEN KÄYTÖN TUTKIMUS

CAM-hoitojen käyttöä tutkitaan terveyssoiologi-
an alalla (10,25). Tieto hoitojen käytöstä on
tärkeää ilmiön laajuuden ja Suomen terveyden-
hoitokeinojen monimuotoisuuden ymmärtämi-
seksi (12). Tällainen tieto voi olla tarpeen poh-
dittaessa CAM-hoitojen sääntelyä (1). Hoitojen
käytön laajuuden ymmärtäminen on merkittävää
myös terveydenhuollon ammattilaisille, kun he
pohtivat, miten toimia CAM-hoitoja käyttävien
kanssa terveydenhuollon kohtaamisissa (esim.
26) ja terveysalan koulutusorganisaatioille, kun
ne määrittävät terveydenhuollon ammattilaisten
CAM-hoitoja koskevia koulutustarpeita (1). On
myös tärkeää tuntea Suomen sisäisiä alueellisia
eroja CAM-hoitojen käytössä, jotta ihmisten
terveyskäyttäytymistä voidaan ennakoida ja ym-
märtää.

CAM-hoitojen käyttö vakiintuneiden hoito-
jen sijasta tai ohella on merkittävä, mutta maas-
samme vähän tutkittu ilmiö (14). CAM-hoito-
jen käytön yleisyyttä alettiin Suomessa tutkia
1970-luvun lopulla (14). Vuosina 1982 ja 1992
käytön yleisyyttä selvitettiin kyselyillä. Vuoden
1982 kyselyyn vastanneista yrttihoitoja oli käyt-
tänyt 17% vastaajista, hierontaa 11%, jäsenkor-
jausta 4%, rentoutushoitoja 5%, akupunktiota
2% ja kuppausta 0,5% ja muuta kansanparan-
nusta 1% (27). Vuoden 1992 tutkimuksessa 37%
vastaajista oli käyttänyt luontaistuotteita tai
luonnonlääkkeitä viimeisen puolen vuoden aika-
na. Naiset käyttivät CAM-hoitoja jonkin verran
enemmän kuin miehet. Yleisimmin oli käyty ki-
ropraktikoiden, naprapaattien ja vyöhyketera-
peuttien vastaanotoilla. (28)

Kansainväliset vertailututkimukset, vaikka
niissä kysytyt hoitomuodot vaihtelevat, tuovat
valaistusta CAM-hoitojen käytön nykytilantee-

seen Suomessa. Vuonna 2014 tehdyssä eurooppalaisessa vertailututkimuksessa (European Social Survey -aineistolla) suomalaisten CAM-hoitojen käyttö nousi verrattain korkeaksi (35.3%) kysyttäessä, oliko henkilö käyttänyt vähintään yhtä terapiamuotoa viimeisen 12 kuukauden aikana (4). Kaikkiaan 21 eurooppalaisen maan vertailussa eri maista vain Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä käyttö oli Suomea korkeammalla tasolla (4). Muissa pohjoismaissa tilanne oli samankaltainen kuin Suomessa: käyttöaste vaihteli Norjan 29 prosentista Tanskan 32 prosenttiin (4). Toisessa CAM-hoitopalvelujen kansainvälisessä vertailussa suomalaisten hoitopalvelujen käyttö puolestaan vaikuttaa maltilliselta; 2011–2013 kerätyn kyselyaineiston perusteella 15,7% suomalaisista oli käyttänyt viimeisen 12 kuukauden aikana perin- tai vaihtoehtoishoidon palveluntarjoajien antamia hoitoja, kun 32 maan vertailussa keskimääräinen käyttöaste oli 26,4% (29).

Olisi tärkeää selvittää CAM-hoitojen käytössä tapahtuneita ajallisia muutoksia, mutta väestötason pitkän aikavälin seurantalutkimukset ovat harvinaisia (30). Jo varhaisissa suomalaisissa vuosien 1982 ja 1992 tutkimuksissa pyrittiin tekemään vertailua ja havaittiin kansanlääkinnän ja luontaislääkkeiden käytön lisääntyneen hieman kyseisenä aikana (31). Kanadalaisessa tutkimuksessa hyödynnettiin väestötason terveyskyselyä, joka mahdollisti 16 vuoden seurantalutkimuksen. Siinä todettiin CAM-hoitojen käytön lisääntyneen 5% yli kymmeneen prosenttiin vuosien 1994–1995 ja 2010–2011 välillä (32). Yhdysvalloissa toteutetussa väestötason terveyskyselyssä aikuisväestön CAM-hoitojen yleisen käytön puolestaan todettiin pysyneen melko vakaana vuosina 2002–2012 (käyttöasteet 2002 32,3%; 2007 35,5%; 2012 33,2%). Lisäravinteet (joiksi ei luettu vitamiineja ja hivenaineita) olivat Yhdysvalloissa suosituin CAM-hoidon muoto koko tarkasteluajanjaksoilla, ja eniten kasvua oli tapahtunut joogan, tai chin ja qi gongin harjoittamisessa. (21) Vuoden 2017 terveyskysely osoitti joogan ja meditaation harjoittamisen edelleen lisääntyneen Yhdysvalloissa, ja lisäksi kiiropraktiikan käyttö oli lisääntynyt vuodesta 2012 (33). Tsekkitutkimuksessa aikaväli oli kanadalaisesta ja amerikkalaisesta tutkimuksesta huomattavasti lyhyempi, eikä siinä ollut käytettävissä laajaa väestön terveystutkimusta, mutta siinäkin CAM-hoitojen käytön todettiin lisääntyneen vuodesta 2011 vuoteen 2014 (34).

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkimme CAM-hoitojen käyttöä kahtena ajan-kohtana, vuosina 2008 ja 2018. Käsitlemme sekä hoitojen käyttöä, uskoa hoitojen parantavuuteen että kokemuksia hoidoista saadusta avusta. Tuoreemman, vuoden 2018 aineiston avulla tarkastelemme myös, millaisia hoitomuotoja suomalaisessa väestössä käytetään tyypillisesti toistensa kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten paljon suomalaiset käyttävät CAM-hoitoja ja millaisia muutoksia käytössä on tapahtunut vuodesta 2008 vuoteen 2018. Tarkastelemme, millaisia hoitoja suomalaiset käyttävät sekä sitä, kokevatko käyttäjät saaneensa hoidosta apua. Tutkimme myös, millaisia mielikuvia suomalaisilla on eri hoitomuotojen mahdollisuuksista parantaa jokin sairaus. Tutkimuskysymykset ovat:

1. Kuinka yleistä erilaisten hoitojen käyttö on ollut Suomessa vuosina 2008 ja 2018?
2. Onko käyttöaste muuttunut 2008–2018?
3. Onko usko hoitojen parantavuuteen, tai kokemus avun saamisesta muuttunut seuranta-aikana 2008–2018?

Vuoden 2018 osalta tutkimme lisäksi:

4. Mitkä sosiodemografiset tekijät liittyvät erilaisten CAM-hoitojen käyttöön?
5. Miten usko hoitojen parantavuudesta liittyy käyttöön?
6. Mitä yhteyksiä erilaisten CAM-hoitojen käytön välillä on?

TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksemme perustuu Taloustutkimuksen keräämiin kyselyaineistoihin vuosilta 2008 ja 2018. Aineistot kerättiin osana Taloustutkimuksen Omnibus-kyselyä, joka pohjautuu kiintiöpöiminnalla valittujen, 15–79-vuotiaiden Suomessa asuvien (Ahvenanmaa pois lukien) kasvokkaiseen haastatteluun. Valtaosa aineistosta on kerätty lähtöosoitemenetelmällä, jossa tietokoneella arvottu lähtöosoite on kiintiöity suuralueen ja kuntatyyppin mukaan ja vastaajat on kiintiöity iän ja sukupuolen perusteella. Lisäksi haastatteluja kerättiin hallihaastatteluina Helsingissä, Tampereella ja Turussa, jolloin ohikulkuevia henkilöitä pyydettiin osallistumaan käyttäen asuinalueen, iän ja sukupuolen mukaista kiintiöintiä. Lopuksi aineisto painotettiin jälkiosituksella vastaamaan perusjoukkoa käyttäen tarkempaa painotuskehikkoa, jossa on muun muassa enemmän ikäluokkia ja lisäksi talouden koko. Sama tiedonkeruuprotokolla oli käytössä kumpanakin tutkimusvuonna. (35).

Taulukko 1. Vuosivertailu 2008–2018.

	Mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut? (Kyllä-vastaukset)				Hoidolla/keinolla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? (Kyllä-vastaukset)				Käytetystä hoidosta on ollut apua			
	2008		2018		2008		2018		2008		2018	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa	809	82,6	821	83,9	990	98,8	1007	99,5	788	97,9	809	99
Reseptilääke	994	99,2	987	96,7	972	97,5	981	96,1	971	98	963	98,4
Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke	907	90,9	849	84,0	751	77,8	707	71,5	814	89,8	754	90,6
Psykoterapia	169	17,5	216	21,3	783	85,1	796	86,4	144	87,3	191	92,8
Liikunta	945	95,0	929	92,6	962	96,2	953	94,5	933	98,4	912	98,7
Ruokavalio	875	88,9	836	83,1	956	95,6	959	95,5	852	97,1	812	97,4
<i>Rohdosvalmiste</i>	344	36,7	274	29,2	432	47,3	308	35,5	221	65,2	182	71,1
<i>Akupunktio</i>	251	25,6	269	28,1	630	71,9	538	64,7	181	74,2	170	71,9
<i>Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)</i>	45	5,1	62	5,5	384	53,4	326	47,4	35	81,6	49	86,4
<i>Homeopatia</i>	106	10,9	84	8,9	350	48,4	231	34,6	72	68,1	51	70,3
<i>Kiropraktiikka</i>	248	27,0	233	27,7	705	80,3	629	77,0	210	88,2	196	88,1
<i>Hypnoosi</i>	63	6,4	47	4,4	310	38,2	285	36,4	33	56,8	27	59,8
<i>Vyöhyketerapia</i>	200	20,9	146	14,3	503	60,7	387	52,9	144	71,1	99	67,3
<i>Aromaterapia</i>	105	11,6	79	7,4	240	29,5	171	21,0	69	67,9	44	54,8
<i>Kansanparannus</i>	177	17,9	135	13,4	437	49,1	349	40,8	141	81,6	99	79,2
<i>Luontaistuote</i>	615	62,2	522	53,8	532	56,7	462	50,7	441	72	363	74,6
<i>Ravintolisävalmiste</i>	466	47,2	539	53,4	390	40,7	393	41,3	330	71,4	364	72,7
<i>Rukous</i>	464	46,2	350	34,3	405	41,8	307	32,6	352	76,9	230	72,8
Itse tai perheenjäsen ei ole käyttänyt mitään mainittua CAM-hoitoa.	134	12,3	192	17,4								

Alaviite 1. Tilastollisesti merkitsevät ($p \leq 0,05$) vuosierot on **tummennettu**

Alaviite 2. n on painottamaton vastaajamäärä. Prosenttiosuudet on laskettu painottamalla.

Alaviite 3. *Kursivoidut* hoidot luokiteltu CAM-hoidoiksi.

Alaviite 4. Avunsaantia hoidosta on kysytty asteikolla 1 Ei yhtään apua – 5 Erittäin paljon apua. Taulukossa vastaajat, jotka ovat vastanneet 3–5.

MUUTTUJAT

Vuosien 2008 ja 2018 vertailussa mukaan otettiin kysymykset ”Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia?” (Kyllä/Ei) ”Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?” (Kyllä/Ei) sekä ”Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?” (1 Ei lainkaan apua – 5 Erittäin paljon apua). Vastajille annettiin lista 18 erilaisesta hoidosta, joihin kysymykset kohdistettiin. Määrittelimme näistä CAM-hoidoiksi luontaistuotteet, ravintolisävalmisteet, rohdosvalmisteet, kiiropraktiikan, aku-

punktion, vyöhyketerapian, kansanparannuksen, aromaterapian, homeopatian, hypnoosin, rukouksen, sekä perinteisen kiinalaisen lääketieteen, joita ei ole tarjolla julkisen terveydenhuollon piirissä. Lisäksi kysymykset kysyttiin koskien leikkausta tai kirurgista toimenpidettä, reseptilääkettä, apteekista ostettavaa itsehoitolääkettä, psykoterapiaa, liikuntaa ja ruokavaliota, joita käsittelemme muina kuin CAM-hoitoina. (Ks. taulukko 1). Luokitelimme CAM-hoidoiksi myös Valviran nimikesuojaamien ammattilaisten tarjoamista hoidoista kiiropraktiikan ja akupunktion, koska ne kuuluvat kansainvälisissä luokituksissa CAM-hoitoihin (3,5,6).

Taulukko 2. Muuttujakuvaukset (vuosi 2018; n=1020).

		n	Keskiarvo (keskihajonta)	Min	Max
Tulot	Alle 20 000	266			
	20–40 000	253			
	40–60 000	148			
	yli 60 000	183			
Koulutus	Peruskoulu	188			
	Toinen aste	417			
	Korkeakoulu	410			
Ikä		1020	46.8 (18.9)	15	79
Sukupuoli	Nainen	555			
	Mies	465			
Päätoimi	Työssä	489			
	Työtön	65			
	Opiskelija	148			
	eläkeläinen	318			
Asuinpaikan koko	Yli 100 000	423			
	50–100 000	144			
	30–50 000	99			
	10–30 000	247			
	alle 10 000	107			
CAM-usko	CAM voi parantaa – summamuuttuja	459	4.66 (3.65)	0	12
	Vahva usko parantavuuteen (ylin kvintiili)	103			
Summamuuttajat komponenteista	Terapia	977	0.98 (1.41)	0	7
	Itsehoito	974	2.14 (1.32)	0	4
	Elintavat	1015	1.74 (0.56)	0	2
	Valtavirta	1013	2.62 (0.63)	0	3
	Psykotterapia & hypnoosi	995	0.26 (0.50)	0	2

Tutkiessamme uskoa CAM-hoitojen parantavuuteen muodostimme summamuuttujan kysymyksestä ”Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia?” (Kyllä/Ei) valitsemalla siihen CAM-hoitoja kuvaavat osiot. Tästä summamuuttujasta poimittiin voimakkaimmin näiden hoitojen tehoon uskovien kärki (20%).

CAM-hoitojen käyttöasteen laskimme summamuuttujana CAM-hoidoista. Sosioekonomisista taustamuuttujista analyysissä mukana ovat sukupuoli, ikä, koulutus, tulot, työllisyys sekä asuinalueen koko (ks. taulukko 2).

MENETELMÄT

Estimoimme CAM-hoitojen käyttöasteen ja 95%:n luottamusvälit. Tutkimme erilaisten CAM-hoitojen käytön ja parantavuususkon muutoksia Khiin neliö -testillä. Vuoden 2018 aineistolla tutkimme myös hoitomuotojen yhteisvaihtelua,

jota analysoitiin ja tiivistettiin eksploratiivisella pääkomponenttianalyysillä (Varimax-rotatio). Käyttäen tilastollisia kriteerejä ja sisällöllistä harkintaa päädyimme 5 komponentin ratkaisuun (ks. taulukko 3) ja tämän analyysin tulosten perusteella muodostimme kullekin komponentille manuaalisesti summamuuttujan käyttämällä vahvimmin latautuneita osioita (0.4 tai enemmän). Tämä ratkaisu mahdollisti ulottuvuuksien yhteisvaihtelun tarkastelun regressioanalyysin avulla ja on vinoon faktorointiin verrattuna yksinkertaisempi tulkita. Summamuuttujien reliabiliteettia arvioitiin Crohnbachin alfan avulla. Keskityimme regressioanalyysissä kahteen selkeään ja tilastollisesti vahvimpaan CAM-hoitoja kuvaavaan summamuuttajaan (ominaisarvo & alfat). Lineaarisen regressioanalyysin selittävinä muuttujina käytimme tavanomaisten sosiodemografisten taustamuuttujien lisäksi muita hoitojen käyttötaipumusta kuvaavia summamuuttujia. Lisäksi

Taulukko 3. Pääkomponenttianalyysin ominaisarvot ja lataukset viidelle komponentille (2018).

	Terapia	Itsehoito	Elintavat	Valtavirta-hoidot	Psykoterapia ja hypnoosi
<i>Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)</i>	0,65	0,00	-0,00	0,09	-0,01
<i>Vyöhyketerapia</i>	0,61	0,10	0,09	-0,06	0,17
<i>Kansanparannus</i>	0,60	0,16	-0,00	0,03	-0,05
<i>Homeopatia</i>	0,57	0,20	0,04	-0,12	0,15
<i>Akupunktio</i>	0,55	-0,02	0,10	0,28	0,11
<i>Kiropraktiikka</i>	0,54	0,03	0,08	0,15	0,07
<i>Aromaterapia</i>	0,51	0,25	0,04	-0,15	0,09
<i>Luontaistuote</i>	0,16	0,77	0,20	-0,02	0,07
<i>Ravintolisävalmiste</i>	0,05	0,74	0,28	0,00	0,17
<i>Rohdosvalmiste</i>	0,33	0,67	-0,02	0,05	-0,03
Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke	-0,01	0,51	-0,09	0,44	-0,04
Liikunta	0,06	0,04	0,82	-0,02	-0,01
Ruokavalio	0,06	0,21	0,79	0,08	0,03
Rukous	0,23	0,29	0,30	0,08	0,10
Reseptilääke	-0,06	0,12	-0,01	0,75	0,07
Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa	0,17	-0,05	0,11	0,64	-0,02
Psykoterapia	0,05	0,14	0,12	0,14	0,76
<i>Hypnoosi</i>	0,25	-0,01	-0,07	-0,08	0,70
Ominaisarvot	3,76	1,70	1,28	1,15	1,02
Crohnbachin alfa summamuuttujalle	0,69	0,69	0,58	0,30	0,28

Kursivoidut hoidot luokiteltu CAM-hoidoiksi.

otimme analyysiin mukaan CAM-hoitoihin uskomista kuvaavan muuttujan. Jälkiositukseen perustuvaa painokerrointa käytettiin vuosivertailussa ja regressioanalyyseissä SPSS:n Complex Samples -moduulin kautta.

TULOKSET

CAM-HOITOJEN KÄYTÖN YLEISYYS VUOSINA 2008–2018

Vertasimme vuosien 2008 ja 2018 tuloksia erilaisten hoitojen käytössä (kuvio 1). Lähes kaikkien hoitojen käyttö oli vähentynyt. Tilastollisesti merkitsevä vähennys näkyi reseptilääkkeiden, apteekista ostettavien itsehoitolääkkeiden, rohdosvalmisteiden, aromaterapian, vyöhyketerapian, liikunnan, luontaistuotteiden, ravintolisävalmisteiden, ruokavalion ja rukouksen käyttöasteessa. Vuoden 2018 aineistossa käytetyimpiä hoitoja olivat leikkaus tai kirurginen toimenpide (83.9%) sekä resepti- ja itsehoitolääkkeet (96.7% ja

84%), liikunta (92.6%) ja ruokavalio (83.1%). CAM-hoidoista yleisimpiä olivat luontaistuotteet (53.8%) ja ravintolisät (53.4%). Lisäksi käytetyimpiä olivat rukous (34.3%), rohdosvalmisteet (29.2%) sekä akupunktio (28.1%) ja kiropraktiikka (27.7%). Vähiten käytettyjä hoitomuotoja olivat hypnoosi (4.4%), kiinalainen lääketiede (5.5%) ja aromaterapia (7.4%).


CAM-hoitojen kokonaiskäyttöä tarkastelimme summamuuttujan avulla. Muuttujaan laskettiin mukaan CAM-hoidoiksi hoidot, joita ei ole tarjolla julkisten terveyspalveluiden yhteydessä. Vastaaajista 12.3% kertoi vuonna 2008 ja 17.4% vuonna 2018, ettei ollut itse tai perheenjäsen ei ollut käyttänyt mitään kyseisistä hoidoista. Muutos oli tilastollisesti merkitsevä.

USKO HOITOJEN PARANTAVUUTEEN JA HOIDOISTA SAATU APU VUOSINA 2008–2018

Usko hoitojen parantavuuteen oli pienempi vuoden 2018 aineistossa kuin vuonna 2008. Ti-

Kuvio 1. Eri hoitomuotojen käyttö vuosina 2008–2018 (%)

Alaviite: Erojen tilastollinen merkitsevyys on merkitty tähdillä: ***: $p \leq 0.00$, **: $p \leq 0.01$, *: $p \leq 0.05$



lastollisesti merkitsevästi laskua oli uskossa reseptilääkkeisiin, apteekin itsehoitolääkkeisiin, akupunktioon, homeopatiaan, vyöhyketerapiaan, aromaterapiaan, kansanparannukseen, luontaisvalmisteisiin ja rukouksen parantavuuteen. Kysymyksessä siitä kuinka paljon saadusta hoidosta on ollut apua ei ollut havaittavissa muutosta eri tutkimusvuosina. Kaikkien hoitojen kohdalla yli 50% vastaajista koki saaneensa apua. Eniten apua koettiin saadun perinteisistä lääketieteen hoitomuodoista, psykoterapiasta, liikunnasta ja ruokavalioista. Myös kiropraktiikkaa ja perinteistä kiinalaista lääketiedettä käyttäneistä noin 90% raportoi saaneensa apua hoidoista. Vähiten apua raportoitiin saadun aromaterapiasta ja hypnoosista, mutta näistäkin apua koki saaneensa yli 54% hoitoa käyttäneistä. (Taulukko 1.)

ERILAISTEN CAM-HOITOJEN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TEKIJÄT

Tutkimme CAM-hoitojen käyttöä ja siihen liittyviä taustatekijöitä faktorianalyysin keinoin. Keskitimme kahteen tulkinallisesti selkeimpään ja tilastollisesti vahvimpaan summamuuttujaan, joita käytämme regressioanalyysin vastemuuttujina. Näistä ensimmäinen muodostuu eri CAM-terapiamuodoista, joissa korostuu hoidon kohteena oleminen. Tälle pääkomponentille ("terapia") la-

tautuvat perinteinen kiinalainen lääketiede, vyöhyketerapia, kansanparannus, homeopatia, akupunktio, kiropraktiikka ja aromaterapia. Toinen komponentti ("itsehoitovalmisteet") muodostuu suun kautta otettavien valmisteiden käytön ympärille ja sille latautuvat luontaisvalmisteet, ravintolisävalmisteet, rohdosvalmisteet ja apteekista ilman reseptiä itse ostettavat lääkkeet. Ensimmäisen ryhmän hoidot ovat terapeuttisia hoitoja, joihin useimmiten liittyy hoidon asiantuntija, joka antaa hoitoa asiakkaalle. Toisessa faktorissa puolestaan hoitojen käyttäminen on itsenäisempää eikä välttämättä perustu asiantuntijan läsnäoloon. Kolmas faktori muodostuu liikunnan ja ruokavalion käyttäjistä, neljäs länsimaisen lääketieteen hoitomuodoista (leikkaus/ kirurginen toimenpide julkisessa terveydenhoidossa, reseptilääke ja apteekin itsehoitolääke). Viidennen faktoriin latautuvat psykoterapia ja hypnoosi.

Esittelemme komponenttianalyysin perusteella tehtyjen summamuuttujien regressioanalyysin tulokset taulukossa 4. Naisilla, iäkkäämmillä ja vastaajilla, jotka asuivat alle 10000 asukkaan kaupungissa oli voimakkaampi taipumus käyttää terapia-komponentin hoitoja. Eri muotojen yhteiskäytön osalta huomasimme, että muista käyttötapa-summamuuttujista ainoastaan länsimaisen lääketieteen käyttö ei ollut tilastollisesti

Taulukko 4. Regressioanalyysi kahdelle CAM-hoitojen summamuuttujalle (2018).

		Terapia				Itsehoito			
		Luottamusväli			p	Luottamusväli			p
		Estimaatti	95%			Estimaatti	95%		
Sukupuoli	Nainen	0,36	0,19	0,54	0,00	0,05	-0,12	0,22	0,57
	Mies
	Ikä	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,06
Koulutus	Peruskoulu
	Toisen asteen koulutus	0,19	-0,05	0,42	0,12	0,11	-0,11	0,34	0,32
	Korkeakoulu	0,05	-0,21	0,31	0,71	0,26	0,02	0,50	0,03
Tulot	Alle 20 000
	20–40 000	-0,09	-0,36	0,18	0,53	-0,08	-0,32	0,17	0,54
	40–60 000	-0,08	-0,40	0,23	0,60	-0,18	-0,45	0,08	0,17
	Yli 60 000	0,20	-0,10	0,50	0,19	-0,22	-0,51	0,08	0,15
	Puuttuvat	0,00	-0,29	0,29	1,00	-0,19	-0,46	0,09	0,19
Työllisyys	Työssä
	Työtön tai hoitovapaalla	-0,15	-0,54	0,24	0,46	-0,17	-0,56	0,23	0,41
	Opiskelija	-0,28	-0,59	0,04	0,09	-0,05	-0,36	0,27	0,76
	Eläkeläinen	-0,08	-0,37	0,21	0,57	-0,28	-0,56	0,01	0,06
Asuinalueen koko (asukasta)	Alle 10 000	0,30	0,01	0,58	0,04	-0,27	-0,54	-0,00	0,05
	10–30 000	0,03	-0,20	0,26	0,79	0,04	-0,17	0,24	0,74
	30–50 000	0,03	-0,32	0,39	0,85	0,02	-0,29	0,34	0,89
	50–100 000	-0,07	-0,29	0,16	0,57	-0,09	-0,33	0,16	0,50
	Yli 100 000
Hoito-komponentit	Itsehoito/terapia	0,25	0,17	0,33	0,00	0,20	0,14	0,26	0,00
	Valtavirta	0,05	-0,07	0,17	0,43	0,77	0,65	0,90	0,00
	Psykoterapia & hypnoosi	0,64	0,41	0,88	0,00	0,14	-0,03	0,31	0,12
	Elintavat	0,17	0,06	0,28	0,00	0,47	0,33	0,60	0,00
CAM-usko	Korkea	0,54	0,19	0,88	0,00	0,64	0,37	0,91	0,00
	Puuttuvat	0,12	-0,06	0,30	0,18	0,15	-0,03	0,33	0,10
	Heikompi usko

Alaviite 1. Tilastollisesti merkitsevät ($p \leq 0,05$) vuosierot on **tummennettu**

merkitsevästi yhteydessä terapiamuuttuun. Usko CAM-hoitojen parantavuuteen oli positiivisesti yhteydessä terapiamuuttuun.

Itsehoitovalmisteiden summamuuttujan regressioanalyysi osoittaa, että etenkin korkeasti koulutetut käyttivät itsehoitovalmisteita. Sukupuoli ei ollut tilastollisesti merkitsevä tekijä ja iän ja eläkkeellä olemisen negatiivinen yhteys itsehoitovalmisteiden käyttöön jäi hieman alle tilastollisen merkitsevyyden rajan. Pienellä paikakakunnalla asuminen vähentää itsehoitovalmisteiden käyttöä. Muista hoitomuodoista muut paitsi psykoterapia ja hypnoosi olivat merkitsevästi ja positiivisesti yhteydessä itsehoitovalmisteiden käyttöön. Erona terapiasummamuuttu-

jaan itsehoito oli myös positiivisesti yhteydessä julkisen terveydenhoidon palveluiden käyttöön. Usko CAM-hoitoihin oli positiivisessa yhteydessä itsehoitovalmisteiden käyttöön.

Testasimme regressioanalyysien robustiuden painojen, asuinpaikan koon ja CAM-hoitoihin uskon suhteen. Ilman painoja tulokset olivat muuten yhteneväisiä, mutta asuinpaikan koon ja tulojen suhteen löytyi eroavuuksia kummasakin mallissa: ilman painoja korkeat tulot tulivat merkitseväksi ja asuinpaikka menetti tilastollisen merkitsevyyden. Asuinpaikan koon tai CAM-hoitoihin uskon jättäminen malleista pois ei muuttanut tuloksia.

POHDINTA

Tulostemme mukaan CAM-hoitojen käyttö on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Tässä kyselyssä käyttöaste nousi yli 80 prosentin, koska siinä kysyttiin käyttöä laajasti, oman käytön lisäksi käyttöä läheisillä (ks. myös aineiston rajoitukset alla). Käytetyimmät hoitomuodot olivat suun kautta otettavat tuotteet (luontaistuotteet, ravintolisät ja rohdosvalmisteet). Muita yleisesti käytettyjä hoitomuotoja olivat rukous, akupunktio ja kiropraktiikka. Vaikka yleinen usko hoitojen parantavuuteen oli laskenut, niin hoitoja käyttäneet kokivat edelleen saaneensa hoidoista apua.

Tutkimme CAM-hoitojen käytön taustatekijöitä ja yhteyksiä eri hoitomuotojen välillä pääkomponentti- ja regressioanalyysin keinoin. Teroja, joihin sisältyy asiantuntijan hoidettavana oleminen, käyttävät eniten naiset ja vanhemmat ikäluokat. CAM-hoitojen ja valtavirtalääketieteen käyttö eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa eli CAM-hoidot eivät vähentäneet valtavirtalääketieteen käyttöä. Käyttö oli positiivisesti yhteydessä muihin löytämiimme komponentteihin eli vastaajat hakivat apua laajasti eri hoitomuodoista. Itsehoitotuotteita käyttivät erityisesti korkeakoulutetut, mutta tämän komponentin suhteen sukupuoli ei ollut merkitsevä tekijä. Itsehoitotuotteiden käyttö oli täydentävää ja yhteydessä valtavirtalääkinnän käyttöön sekä muihin hoitomuotoihin paitsi psykoterapiaan ja hypnoosiin. Kumpikin CAM-käyttömuoto oli vahvasti ja itsenäisesti yhteydessä uskon hoitojen parantavuudesta.

Julkisessa keskustelussa ja tutkimuksissa usein väitetään, että CAM-hoitojen käyttö on pitkällä aikavälillä lisääntynyt merkittävästi (1,27). Aineistojemme perusteella CAM-hoitojen käyttö suomalaisessa väestössä on kuitenkin kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla vähentynyt eikä lisääntynyt. Yksi syy CAM-hoitojen käytön vähenemiseen voi olla julkinen keskustelu, jossa esimerkiksi lääkärinkunta ottaa vahvan tuomitsevan kannan näihin hoitoihin korostaen niiden käyttöön liittyviä riskejä ja haittavaikutuksia (8,26,36). Toisaalta käytön väheneminen voi johtua hoitojen nopeasti muuttuvista trendeistä. Esimerkiksi aromaterapia ja vyöhyketerapia saattoivat olla aiempina ajankohtana nykyistä suosittumia uudehkoja hoitomuotoja. Valviran nimeksesuojatun, manipulatiivisiin CAM-hoitoi-

hin usein luokitellun kiropraktiikan käytössä ei ollut tilastollisesti merkitsevää laskua, mikä voi tarkoittaa sen vakiintumista tiettyjen käyttäjäryhmien hoidoksi. Toisaalta näiden mieltäminen terveydenhuollon ulkopuolisiksi voi olla erilaista kuin muissa CAM-hoidoissa, koska koulutetut kiropraktikot, naprapaattit ja osteopaattit ovat kuuluneet jo vuodesta 1994 terveydenhuollon nimeksesuojattuihin ammatteihin (16).

Tutkimuksemme vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että CAM-hoidot ovat käyttäjien näkökulmasta arvioiden monille merkittävä keino hoitaa terveyttä ja huolehtia hyvinvoinnista. Osa hoitomuodoista voisi olla käsitettävissä terveyttä edistäviksi hyvinvointihoidoksi, ei sairautta hoitaviksi. Osa hoidoista saatetaan käyttää lääkärin määräämien hoitojen vaihtoehtona. Joka tapauksessa kyseessä on laaja terveydenhoidollinen ilmiö, joka vaatii seuranta ja joka vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden kohtaamisissa.

AINEISTON RAJOITUKSET

Tutkimuksemme ei pyri ratkaisemaan kaikkia alussa kuvattuja CAM-käyttötutkimuksen vertailtavuuden ongelmia. Aineiston rajoituksista voidaan mainita muissakin CAM-tutkimuksissa vallitseva ongelma kysymyksenasettelusta: tässä tutkimuksessa oli kysytty hyvin laveasti, onko vastaaja itse tai joku hänen perheenjäsenensä käyttänyt hoitoja. Näin ollen vastaukset eivät kerro tarkasti henkilökohtaisesta käytöstä. Lisäksi kysymykselle ei ollut asetettu aikarajausta, joka olisi tarkentanut käyttöastetta esimerkiksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Kysytyssä hoitomuotojen listassa ei ole esimerkiksi hierontaa, joka usein nostaa käyttöastetta lisää. Esimerkiksi Kajava-terapia ja hermoratahieronta ovat luokiteltavissa CAM-hoidoiksi, kun taas klassiset hierojat ovat Valviran rekisteröimä ammattikunta (vrt. taulukko 1).

Tutkimukseen tulivat mukaan vain ne CAM-hoidot, jotka oli mainittu ensimmäisessä, vuoden 2008 kyselyssä. Siksi monet itsehoitona sovellettavat CAM-hoidot, kuten jooga, tai chi tai qi gong, joiden käyttö Yhdysvalloissa oli lisääntynyt eniten tarkastelujaksolla 2002–2012 (21), eivät olleet mukana tässä tutkimuksessa. Myöskään mindfulness ei ollut mukana tutkimuksessa. Kansanparannus-termi saattoi vuonna 2018 vaikuttaa vanhahtavalta. Rukouksen mukanaolo

tutkimuksessa on ongelmallista, koska sen voi ymmärtää enemmän uskonnolliseksi kuin terveydenhoidon toiminnaksi.

Asuinalueen kokoa koskevia tuloksia voi pitää korkeintaan suuntaa antavina. Kyseessä on hierarkkisesti yksilötasoa ylemmän tason tieto, jolloin jo aineiston luonnollinen ryvästymisen heikentää estimoinnin tehoa. Näin ollen saadut merkitsevyystasot ovat liian pieniä. Toisaalta tulos on kuitenkin itse kertoimien tasolla varsin vahva, joten pidimme muuttujan sisällyttämistä perusteltuna keskustelunavauksen mielessä.

Koska aineisto ei ole tavanomainen satunnaisotos perusjoukosta eikä saatavilla ollut tarkkoja yksikkökohtaisia otantatietoja otannan erityispiirteiden huomioimiseksi, tehdyt tilastolliset testit olettavat painotukseen perustuvan yksinkertaisen satunnaisotannan. Oletus on sikäli perusteltu, että taustalla on kaksi eri suuntiin vaikuttavaa tekijää: yhtäältä aineiston ryvästymisen heikentää otoksen tehoa, mutta kiintiöinnin voi katsoa muistuttavan eräiltä osin ositusta, joka taas parantaa tehoa. Näin ollen nämä tekijät kumoavat osittain toistensa vaikutusta,

jolloin oletus yksinkertaisesta satunnaisotannasta on lopulta sopivin käytettävissä oleva lähestymistapa. Yhtä kaikki haluamme korostaa, että tulokset ovat vain suuntaa antavia, minkä vuoksi tulkinnoissa on syytä olla maltillinen.

RAHOITTAJAT:

Tutkimus on saanut rahoitusta Emil Aaltosen säätiöltä (Terveys, tieto ja asiantuntijuus -projekti), Koneen Säätiöltä (Crossing Borders for Health and Well-being -projekti) ja Suomen Akatemialta (rahoitusnumero 312310: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö; Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusnumerot 327145 ja 327148: DigiIN-hanke).

KIRJOITTAJEN KONTRIBUUTIOT:

Vuolanto vastasi käsikirjoituksen laatimisesta. Laura Kemppainen ja Teemu Kemppainen vastasivat tilastollisen aineiston käsittelystä ja analyysistä. Nurmi osallistui tutkimuksen suunnitteluun ja analyysiin. Kaikki kirjoittajat osallistuivat käsikirjoituksen kirjoittamiseen.

Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., Nurmi, J. *The use of complementary and alternative treatments (CAM) in Finland. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti – Journal of Social Medicine* 2020; 57: 44–56.

This article explores the use of complementary and alternative medicine (CAM) in Finland in 2008 and 2018. CAM therapies are a diverse set of treatments that are not included in mainstream medicine at a certain historical and societal context. Use of CAM modalities alongside officially accepted treatments is a significant phenomenon seldom researched in Finland. The aim of the research was to analyze how much Finns used CAM-therapies and the changes in the usage from year 2008 to 2018. We studied the treatments that the respondents used and perceived good effects of the treatments. We used data collected by Taloustutkimus and analyzed it with Khi square test, explorative component analysis and linear regression analysis.

Our results show that the use of CAM had decreased during past ten years. The most used CAM modalities were those that taken by mouth (natural products, dietary supplements and medicinal drugs). Other frequently used CAM was prayer, acupuncture and chiropractic. Although belief in the treatments had decreased, those us-

ing the treatments has still received help from the treatments. The use of CAM did not decrease use of mainstream medicine. The respondents used treatments broadly.

Keywords: complementary and alternative medicine, CAM, use of CAM, belief medication, Finland.

Saapunut 09.04.2019

Hyväksytty 06.08.2019

LÄHTEET

- (1) Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus. Vaihetohtohoitajien sääntelyn tarve. Vaihetohtohoitajia koskevan lainsäädännön tarpeita selvittävään työryhmän raportti 2009. Luettu 15.1.2020. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2810-7>
- (2) Fulder S. The basic concepts of alternative medicine and their impact on our views of health. *J Altern Complement Med* 1998; 2: 147–158.
- (3) National Center for Complementary and Integrative Health. Complementary, Alternative,

- or Integrative Health: What's In a Name? Luettu 15.1.2020. <https://nccih.nih.gov/health/integrative-health>
- (4) Kempainen L, Kempainen T, Reippainen J, Salmenniemi S, Vuolanto P. Use of complementary and alternative medicine in Europe: Health-related and sociodemographic determinants. *Scand J Public Health* 2017. doi: 10.1177/1403494817733869
 - (5) Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public Staff, Board on Health Promotion and Disease Prevention Staff, Institute of Medicine Staff, et al. *Complementary and Alternative Medicine in the United States*. Washington, D.C: National Academies Press; 2005;2004. Luettu 15.1.2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83804/#ch1.s2>
 - (6) U.S.National Library of Medicine. Complementary Therapies MeSH descriptor data. Luettu 15.1.2020. <https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000529>
 - (7) Danell JA, Danell R. Publication activity in complementary and alternative medicine. *Scientometrics* 2009;80:539–551.
 - (8) Salminen V. Syövän vaihtoehtohoidot. *Duodecim* 2017;133:2102–9.
 - (9) Mäkelä M, Haapoja H. Puoskaroinnista lääketieteeseen ja takaisin. *Duodecim* 2016;132:2169–75.
 - (10) Gale N. The sociology of traditional, complementary and alternative medicine. *Sociol Comp* 2014;8:805–822.
 - (11) Hemilä H. Uskomuslääkintä on harhaanjohtava termi. *Duodecim* 2016;132:1389–90
 - (12) Hokkanen M, Kananaja K. Kiistellyt tiet terveyteen. Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa. Helsinki: SKS; 2017.
 - (13) Seppänen J, Kamaja M, Myllykangas M, Tuomainen T-P. CAM ei ole neutraali termi. *Suomen Lääkäril* 2016;71:2404–2405.
 - (14) Vuolanto P, Sorsa M, Aarva P, Helin K. Katsaus suomalaiseen CAM-tutkimukseen. *Sosiaalilääketiet Aikakausi* 2018;55:243–259.
 - (15) Vuolanto, P. The incompatibility between social worlds in complementary and alternative medicine: The case of therapeutic touch. Kirjassa: Brosnan C, Vuolanto P, Brodin Danell JA. (toim.) *Complementary and alternative medicine: Knowledge production and social transformation*. Cham: Palgrave Macmillan; 2018, 59–84.
 - (16) Valvira. Terveydenhuollon ammattioikeudet 2017. Luettu 15.1.2020. <https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet>
 - (17) Danell JA, Danell R, Vuolanto P. Scandinavian research on complementary and alternative medicine: A bibliometric study. *Scandinavian Journal of Public Health* 2019. doi: 10.1177/1403494819834099
 - (18) Hemilä H. Vaihtoehtohoito voi joskus perustua näyttöön. *Suomen Lääkäril* 2016;71(18):1298–9.
 - (19) Louhiala P, Hemilä H. Can CAM treatments be evidence-based? Perspective. *Focus on Alternative and Complementary Therapies*. 2014;19:84–89.
 - (20) Quandt SA, Ip EH, Saldana S, Arcury TA. Comparing two questionnaires for eliciting CAM use in a multi-ethnic US population for older adults. *European Journal of Integrative Medicine* 2012;4:e205–e211.
 - (21) Clarke T, Black LI, Stussman BJ, et al. Trends in the use of complementary health approaches among adults; United States, 2002–2012. *Natl Health Stat Report* 2015; 79:1–16.
 - (22) Koithan M. Introducing Complementary and Alternative Therapies. *J Nurse Pract* 2009; 1: 18–20.
 - (23) Quandt SA, Verhoef MJ, Arcury TA, Lewith GT, Steinsbekk A, Kristoffersen AE, et al. Development of an International Questionnaire to Measure Use of Complementary and Alternative Medicine (I-CAM-Q). *Journal of Alternative & Complementary Medicine* 2009 04;15(4):331–339.
 - (24) Bryden GM, Browne M. Development and evaluation of the R-I-CAM-Q as a brief summative measure of CAM utilisation. *Complementary Therapies in Medicine* 2016;27: 82–86.
 - (25) Siahpush M. A critical review of the sociology of alternative medicine: research on users, practitioners and the orthodoxy. *Health* 1999;4:159–178.
 - (26) Lääkäriliitto. 14.12.2017. Suositus lääkärin suhtautumisesta uskomushoitoihin. Luettu 15.1.2020. <https://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/suosituksset/suositus-laakarin-suhtautumisesta-uskomushoitoihin/>
 - (27) Vaskilampi T, Meriläinen P, Sinkkonen S. The use of alternative treatments in the Finnish adult population. *Complem Med Res* 1992;6:9–20.
 - (28) Vartiainen E, Koskela K, Tikkanen J ym. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö Suomessa 1992. Kirjassa: Koskela K, Vaskilampi T, Vartiainen E, Meriläinen P, Viinamäki H, Mäntyranta T. (toim.) *Vaihtoehtolääkintä Suomessa 1982-1992*. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 3; 1993, 13–36.
 - (29) Peltzer K, Pengpid S. Prevalence and determinants of traditional, complementary and alternative medicine provider use among adults from 32 countries. *Chinese Journal of Integrative Medicine* 2018; 24: 584–590.
 - (30) Eardley S, Bishop F, Prescott ym. A systematic literature review of complementary and alternative medicine prevalence in EU. *Forsch Komplementmed* 2012;19:18–28.
 - (31) Vaskilampi T, Vartiainen E, Meriläinen P, ym. Vaihtoehtolääkinnän tuntemuksen ja käytön muutoksia – tuloksia kymmenvuotisseurannasta. Kirjassa: Koskela K, Vaskilampi T, Vartiainen E, Meriläinen P, Viinamäki H, Mäntyranta T. (toim.) *Vaihtoehtolääkintä Suomessa 1982–1992*. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 3; 1993, 63–78.

- (32) Canizares M, Hogg-Johnson S, Gignac MAM, Glazier RH, Badley EM. Changes in the use practitioner-based complementary and alternative medicine over time in Canada: Cohort and period effects. PLoS ONE 2017;12(5).
- (33) Tainya C. Clarke; Patricia M. Barnes, Lindsey I. Black, Barbara J. Stussman, and Richard L. Nahin. Use of Yoga, Meditation, and Chiropractors Among U.S. Adults Aged 18 and Over. NCHS Data Brief, No. 325, November 2018.
- (34) Pokladnikova J, Selke-Krulichova I. The Use of Complementary and Alternative Medicine by the General Population in the Czech Republic: A Follow-Up Study. Comp Med Res 2018;25(3):159–166.
- (35) Puska J. 2018. Taloustutkimus. Henkilökohdainen tiedonanto.
- (36) Pälve H. Vaihtoehtoiset hoidot eivät kuulu lääketieteeseen. Potilaan lääkärilehti 20.2.2018. Luettu 15.1.2020. <http://www.potilaanlaakarilehti.fi/laakarit-ottavat-kantaa/laakariliiton-palve-vaihtoehtoiset-hoidot-eivat-kuulu-laaketieteeseen/>

PIA VUOLANTO
Dosentti, tutkija
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTI

LAURA KEMPPAINEN
VTT, yliopistotutkija
Helsingin yliopisto
Valtiotieteiden tiedekunta
Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö
DigiIN-hanke

TEEMU KEMPPAINEN
VTT, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
Geotieteiden ja maantieteen laitos

JOHANNA NURMI
VTT, tutkijatohtori
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Terveystieteet